

CORPORACIÓN MUNICIPAL VIÑA DEL MAR PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
AREA DE SALUD



CARTA MADRES, PADRES Y/O APODERADOS
VACUNACIÓN ANTI-INFLUENZA Y ANTI-COVID
EN CONTEXTO DE PANDEMIA

Viña del Mar, Marzo 2022

ESTIMADOS/AS
MADRES, PADRES Y/O APODERADOS.

Por medio del siguiente documento informamos a ud., que el Ministerio de Salud ha determinado el inicio de la **Campaña de Vacunación Anti-Influenza 2022** el cual será ejecutado en Establecimientos Educativos en cursos de **educación pre-básica hasta 5° año básico (desde 6 meses de edad hasta 5° básico independiente de la edad)** según establece Decreto Exento N°4 del 25 de Enero 2022. Además, en paralelo se suma la continuación de la **Vacunación Anti-COVID para personas iguales o mayores de 3 años**, que se realiza según indica Ministerio de Salud mediante Calendarios de Vacunación y/o otras comunicaciones del Ministerio de Salud.

La manera más efectiva de mantener a su hijo/a sano/a es a través de la vacunación, ya que previene enfermedades que pueden llegar a ser peligrosas. La vacunación tiene como objetivo la disminución de las enfermedades y la mortalidad asociada a enfermedades inmunoprevenibles.

Por lo anterior, la **vacunación anti-influenza es de carácter obligatorio**, respaldado por decreto del Ministerio de Salud. Por el contrario, la **vacunación anti-COVID es de carácter voluntario** y por ende requiere de consentimiento informado firmado por apoderado.

Adicionalmente, se comunica que el Ministerio de Salud ha recomendado la coadministración de vacunas contra la influenza junto con las vacunas contra SARS-CoV-2 y/o vacunas del programa habitual en personas de 3 años y más, con la finalidad de no perder oportunidad de vacunación. Esta decisión se basa en múltiples estudios y recomendaciones internacionales que han determinado que la coadministración de vacunas anti-COVID con otras vacunas como la influenza, no implican problemas de seguridad y conservan las respuestas de los anticuerpos.

Al igual que años anteriores, realizaremos el proceso de vacunación en sus establecimientos educativos, acercando el proceso de vacunación con todas las medidas correspondientes por **Emergencia Sanitaria por Pandemia COVID-19**.

1. La vacunación se administra a *personas sanas*. La vacunación deberá ser postergada en personas con estado febril o infección aguda. Por este motivo, personas con estado febril y/o otros síntomas sugerentes de infección aguda (COVID-19 u otra) **NO DEBEN** vacunarse y en caso de presentar síntomas sugerentes de COVID deberán consultar con médico.
2. Si su hijo/a por indicación médica no debe ser vacunado por motivos de salud incompatible, deberá acreditarlo solo por medio de un **CERTIFICADO MEDICO que se debe presentar a enfermera/o el día de la vacunación**. Como madre/padre/apoderado, ud tiene el deber de informar si su hijo/a presenta alguna de estas contraindicaciones y/o alguna condición que amerite precauciones especiales.
3. Según lo establecido por MINSAL, **en el caso de Vacunación Anti-Influenza**, tras ausencia de certificado médico u otra notificación por escrita, la enfermera coordinadora asumirá que no existen contraindicaciones ni otro tipo de impedimentos para administrar la vacuna anti-influenza.
4. Todo menor ausente en la fecha de vacunación asignada para su colegio idealmente deberá presentarse en CESFAM para regularizar su vacunación.
5. Cualquier reacción adversa asociada a vacunas que presente el menor vacunado/a deberá ser informada a Enfermera Encargada de Programa de Inmunización. o acudir al vacunatorio del CESFAM, de producirse en domicilio o días posteriores.

Para el resguardo de la comunidad educativa será importante la colaboración de todos y respetar las instrucciones entregadas por el sector salud y sus profesionales, quienes los guiarán en este proceso.

**CORPORACIÓN MUNICIPAL VIÑA DEL MAR PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
AREA DE SALUD**

Vacunación Anti-Influenza				
Vacuna	Nivel	Protege contra	Contraindicaciones y/o Precauciones	Reacciones y Cuidados
Anti-Influenza: Influvac	Prebásica: Sala Cuna Medio Transición Básica: 1° Básico 2° Básico 3° Básico 4° Básico 5° Básico	Tipos de Influenza: • Influenza A (H1N1) • Influenza A (H3N2) • Influenza B	<ul style="list-style-type: none"> • Advertencias especiales y precauciones en el uso: Antecedentes de Síndrome Guillain-Barre. Pacientes con inmunosupresión pueden presentar una respuesta inmunológica disminuida. • Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la vacuna: trazas de huevos (ovoalbúmina), formaldehído, bromuro de cetiltrimetilamonio bromuro o polisorbato 80 o gentamicina. 	<p>Reacciones locales esperados (sitio de punción): Enrojecimiento, edema, dolor, equimosis e induración.</p> <p>Las reacciones adversas más comunes son: Cefalea, sudoración, mialgia (dolor muscular), artralgia (dolor de articulaciones), fiebre, malestar, escalofríos y fatiga.</p>

IMPORTANTE: En niños entre 6 meses hasta los 8 años 11 meses 29 días quienes por primera vez reciben vacunación anti-influenza o aquellos con esquemas de vacunación previa incompleta, deben recibir 2 dosis de la vacuna separadas por 4 semanas para activar la protección inmunológica adecuada.

Vacunación Anti-COVID				
Vacuna	Edad	Protege contra	Contraindicaciones y/o Precauciones	Reacciones
Anti-COVID: Sinovac	Igual o Mayor a 3 años	Coronavirus tipo: • SARS-CoV-2	<ul style="list-style-type: none"> • Advertencias especiales y precauciones: Personas con diabetes o historial de convulsiones, epilepsia, encefalopatía o enfermedad mental o historial familiar de estas enfermedades. • Contraindicaciones: Hipersensibilidad o reacciones alérgicas (Ej: Anafilaxia) a cualquier componente de la vacuna: hidróxido de aluminio, hidrogeno fosfato de sodio, dihidrogeno fosfato de sodio y cloruro de sodio. Personas con condiciones neurológicas severas (Ej: Mielitis transversa, Sd. De Guillian-Barre, Enfermedades Desmielinizantes). Pacientes con enfermedades crónicas severas incontroladas. Mujeres embarazadas y/o en lactancia. 	<p>Reacciones locales esperados (sitio de punción): Enrojecimiento, edema, dolor, equimosis e induración.</p> <p>Las reacciones adversas más comunes son: Cefalea, sudoración, mialgia (dolor muscular), artralgia (dolor de articulaciones), fiebre, malestar, escalofríos y fatiga.</p>
Anti-COVID: Pfizer Pediátrico	5 años – 11 años 11 meses 29 días	Coronavirus tipo: • SARS-CoV-2	<ul style="list-style-type: none"> • Contraindicaciones: Hipersensibilidad o reacciones alérgicas (Ej: Anafilaxia) a cualquier componente de la vacuna: ARN mensajero modificado con nucleósidos (en nanopartículas lipídicas), lípidos, colesterol, trometamina, clorhidrato de trometamina, sacarosa o cloruro de sodio. • Advertencias especiales y precauciones: Se han informado casos muy raros de miocarditis y pericarditis después de la vacunación. 	<p>Reacciones locales esperados (sitio de punción): Enrojecimiento, edema, y dolor.</p> <p>Las reacciones adversas más comunes son: Cefalea (dolor de cabeza), mialgia (dolor muscular), artralgia (dolor de articulaciones), fiebre, linfadenopatía, náuseas, rash, malestar, disminución del apetito, escalofríos y fatiga.</p>
Anti-COVID: Pfizer	Igual o mayor de 12 años	Coronavirus tipo: • SARS-CoV-2	<ul style="list-style-type: none"> • Contraindicaciones: Hipersensibilidad o reacciones alérgicas (Ej: Anafilaxia) a cualquier componente de la vacuna: ARN mensajero modificado con nucleósidos (en nanopartículas lipídicas), lípidos, colesterol, cloruro de potasio, fosfato monobásico de potasio, cloruro de sodio, fosfato sódico dibásico dihidrato, sacarosa. • Advertencias especiales y precauciones: Los datos disponibles para vacunación de embarazadas y lactantes amamantando son limitados. 	<p>Reacciones locales esperados (sitio de punción): Enrojecimiento, edema y dolor.</p> <p>Las reacciones adversas más comunes son: Cefalea (dolor de cabeza), mialgia (dolor muscular), artralgia (dolor de articulaciones), fiebre, malestar, escalofríos, náuseas, linfadenopatía y fatiga.</p>

IMPORTANTE: Las reacciones más comunes de las vacunas son similares e incluyen reacciones en el sitio de punción y otras reacciones sistémicas. Estas suelen ser leves y desaparecen sin tratamiento después de 1 a 2 días. Solo administrar medicamentos recetados por médico en caso de malestar. En caso de fiebre igual o mayor a 37,5°C que no cede con fármacos, consultar con médico.